

Ueber

OVARIOTOMIE

Inaugural-Abhandlung

zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Hofrathes, Obermedicinalrathes, Professors

Dr. von Hecker,

Director der Gebäranstalt dahier,

der medicinischen Facultät zu München vorgelegt

von

Michel Seligmann

prakt. Arzt aus Hamburg.

München, 1877.

Königliche Hof- & Universitäts-Buchdruckerei

von Dr. C. Wolf & Sohn.

Ueber

OVARIOTOMIE

Inaugural-Abhandlung

zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Hofrathes, Obermedicinalrathes, Professors

Dr. von Hecker,

Director der Gebäranstalt dahier,

der medicinischen Facultät zu München vorgelegt

von

Michel Seligmann

prakt. Arzt aus Hamburg.

München, 1877.

Königliche Hof- & Universitäts-Buchdruckerei

von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Nachdem es mir bereits zu wiederholten Malen gestattet gewesen ist, der operativen Entfernung von Ovariengeschwülsten beizuwohnen, ist es mir auffällig geworden eine wie große Verschiedenheit, sowohl in den Operationsmethoden, als auch in der Nachbehandlung vorhanden ist und habe ich mich daher entschlossen in Vorliegendem eine kurze Uebersicht der bis jetzt in Betracht kommenden Methoden zu geben.

Schon im Jahre 1685 wurde die Ovariectomie von Theodor Schorkopf und de la Porte vorgeschlagen, 1701 von Houftoun bei Glasgow glücklich ausgeführt, denn die Patientin starb erst 16 Jahres später, aber erst 1809 zum ersten Male in absichtlicher Weise von Mac Dowell mit glücklichem Erfolge ausgeführt, denn die Patientin starb erst 25 Jahre später. Er operirte bis 1830 im ganzen 13 Mal, darunter 5mal mit tödtlichem Ausgang. Die erste Ausführung derselben in Deutschland geschah 1819 durch Chrysmar in Württemberg jedoch mit schlechtem Erfolge, denn die Patientin starb alsbald. Eine gleichfalls von Lizars als die erste in England 1825 vorgenommene Operation endete mit dem Tode der Patientin. Clay begann erst 1842 zu operiren. Die Resultate der Operationen waren bis 1850 sehr schlechte, so daß Dieffenbach die Operation 1846 noch als eine solche bezeichnet, die weder dem Arzt noch der Kranken Segen bringt.

Von da ab mehrten sich, trotz dieses Ausspruches, namentlich in England und Amerika die Zahl der Opera-

tionen und auch die Resultate wurden besser. In Deutschland jedoch blieb man noch während längerer Zeit der Operation fern, da man hier stets an der Furcht das Peritoneum zu eröffnen festhielt und daher die Ovariectomie als einen sehr gewagten ja absolut lebensgefährlichen Eingriff betrachtete. Jetzt jedoch hat diese Operation hauptsächlich seit den schönen Resultaten von Spencer Wells (25 Proz. Mortalität und nach einer Berechnung angestellt bei 25 Operateuren von Thomas entfallen nur 504 Todesfälle auf 1638 Operirte) Bürgerrecht auch bei uns erlangt und viele eifrige Nachahmer gefunden. Gemeingut der Aerzte ist sie aber durchaus noch nicht geworden. Der Eingriff ist allerdings ein sehr bedeutender, aber in Hinsicht auf die große Unbequemlichkeit die den Kranken durch die Ovarientumoren erwächst, die durch ihr schnelles Wachsthum allein schon den Tod hervorbringen können und Angesichts der sich immer mehr steigenden günstigen Erfolge, ist selbst dieser schwere und gefahrvolle Eingriff zu vertheidigen.

Spencer Wells dem unstreitig die größten Erfahrungen zur Seite stehen, gibt für die 500 von ihm Operirten folgende Statistik:

1. Hundert . .	34	Todesfälle
2. „ . .	28	„
3. „ . .	23	„
4. „ . .	22	„
5. „ . .	20	„

Und auch diese Zahl glaubt er noch bis auf 10 Proz. herabmindern zu können, da er in letzter Zeit in der Privatpraxis nur noch 14 Proz. Todesfälle zu verzeichnen hatte.

Keith hatte sogar bei 166 Operirten von 1863—71 im ersten Hundert nur 19 Todesfälle, bei den übrigen jedoch nur 30 glückliche Operationen.

Koeberle hatte 1871 25 Proz. und 1872 20 Proz. Misserfolge zu beklagen.

Zuerst wurde die Operation hauptsächlich in England vorgenommen und haben wir den Engländern auch jetzt

noch viele Verbesserungen, wenn nicht die meisten in der Operationsmethode zu verdanken.

In Frankreich hat erst 1862 Nélaton die Ovariectomie zu Ansehen gebracht, früher war sie der Mißerfolge wegen gesetzlich verboten.

Zwei Theile standen der Cultivirung der Operation hauptsächlich entgegen und zwar das Fehlen der Anaesthetika und die nicht genügend gesicherte Differentialdiagnose zwischen Schwangerschaft und Ovarienerkrankungen.

Der erstgenannte Einwurf ist durch die Erfindung des Aether, Chloroform und Chloralhydrat beseitigt und auch der zweite ist nicht mehr stichhaltig, denn es wird doch bei unserer jetzt so gut ausgebildeten Diagnostik nur in wenigen Fällen noch ein Irrthum möglich sein und hat überdies die Erfahrung auch gelehrt, daß die Probeincisionen nicht gerade sehr gefahrvoll sind.

Jedenfalls werden auch die Patientinnen in vielen Fällen es vorziehen, sich einer Radicaloperation, mit selbst zweifelhaftem Erfolge, zu unterwerfen, als ein langsames aber stetiges Schwinden ihrer Kräfte eintreten zu sehen.

Es wird daher auch der Entschluß der Patientin für den Arzt mit in Betracht zu ziehen sein, denn nur bei Einwilligung des Patienten wird auch die Willenskraft derselben bei der Operation und Nachbehandlung ausreichen.

Bei kleinen das Leben nicht gefährdenden Tumoren, die auch nicht an GröÙe zunehmen, ist stets von der Operation abzurathen, denn dieselbe bleibt selbst bei den jüngsten glücklichsten Resultaten immer ein kühner Eingriff. Bei Leiden anderer wichtiger Organe als Niere, Lunge und dgl. soll man die Operation überall nicht vornehmen. Die Adhäsionen werden schon deshalb keine Contraindication abgeben, weil dieselben diagnostisch nur sehr schwer genau festzustellen sein werden.

Etwas genauere Diagnostik ist auch in Bezug auf Adhäsionen noch möglich geworden, seitdem Simon die Rectaluntersuchung in die Praxis eingeführt hat. Es kann diese aber nur in tiefster Narkose vorgenommen werden.

Auch bei Entzündung und Vereiterung der Cyste, selbst Peritonitis ist noch von namhaften Operateuren mit

schönem Erfolge operirt worden. Ob auch dem Alter ein Einfluss auf die Operation zuzuschreiben ist, steht noch nicht fest, jedenfalls ist es überraschend, dass nach der Statistik von Spencer Wells das Alter vor dem 25 Jahr und nach dem 60 Jahr sich als die günstigere Zeit ergibt, in Bezug darauf ob verheirathet oder nicht ergibt die Statistik fast gleiche Resultate.

Auch gleichzeitige Schwangerschaft hat man als Contraindication angesehen, aber auch hier sind schon von Spencer-Wells 4 Fälle und von Marion Sims 1 Fall bekannt in denen die Schwangerschaft trotz der Operation glücklich weiter verlief. Man nimmt die Operation am Besten in der Zeit zwischen zwei Menstruationen vor.

Nachdem ich nun im Vorhergehenden mich kurz über die geschichtliche Entwicklung der Operation ausgesprochen habe, gehe ich nun zu der Operationsmethode über.

Es empfiehlt sich die Operation stets in der Rückenlage vorzunehmen. Denn wenn auch die Seitenlage wegen des besseren Abflusses und nicht Einfließens in die Bauchhöhle indicirt erscheint, so wird man dabei doch fast jedesmal ein Vorfallen der Gedärme erhalten, wohingegen das in die Bauchhöhle eingeflossene Blut und Cysteninhalt doch relativ leicht wieder zu entfernen sind.

Die Patientin soll in zweckmässiger Weise ernährt sein und schon einige Stunden vor der Operation Nichts mehr geniessen, da sonst das Erbrechen bei der Chloroformnarkose nur gesteigert wird. Man gebe der Patientin auch noch ein Klysma um den Darm vollständig zu entleeren.

Während die Narkose, die bis zur vollkommenen Intoleranz der Patientin gesteigert werden muss, eingeleitet wird, reinige man die Bauchdecke am besten mit desinficirenden Lösungen und entferne die Haare, sodann muss man auch eine mit einem kreisrunden Auschnitte versehene wasserdichte Unterlage auf dem Abdomen befestigen, um das Beschmutzen der Wäsche der Patientin, sowie dieser selbst zu verhüten.

Die Instrumente, selbst die nur in complicirteren Fällen Anwendung findenden, müssen stets bereit liegen und wohl desinficirt sein, die Schwämme nimmt man am besten neu.

Im Ganzen wird man wohl mit nachstehenden Instrumenten stets ausreichen. Mehrere spitze und geknöpfte Bistouries, gerade und gebogene Scheeren, Mufeux'sche und Nélaton'sche Zangen, Unterbindungspincetten, Hohlfonde, Hackenpincetten, anatomische Pincetten, Nadeln, Troicart, Glüh-eisen, Klammer, ausserdem noch Schwämme, Silberdraht, Seide, Catgut, Tinct. ferri sesquichlorati und auch Drainageröhren mit dem entsprechenden Troicart. Das Bett in dem die Patientin nach der Operation gebracht wird, muss gleichfalls hergerichtet, gut erwärmt und das Krankenzimmer gut ventilirbar sein.

Das Operationszimmer muss hell, sehr warm (20°R) und mit Wasserdämpfen erfüllt sein. Der Hautschnitt geschieht sodann in der Länge von ungefähr 10 ctm. in der linea alba und zwar mit grosser Vorsicht, stets in der Mittellinie, da sonst das Perimysium der Bauchmuskulatur geöffnet wird und zu langdauernden Eiterungen der Bauchdecken Veranlassung werden kann. Nachdem man früher, je nach der Grösse des zu entfernenden Tumors, den Hautschnitt machen zu müssen glaubte, ist man jetzt dahin gekommen, den Schnitt möglichst klein zu machen und den Tumor, erst nach der Punktion selbst mit theilweiser Abtragung hindurchzuziehen.

Spencer-Wells hat nämlich gezeigt, dass je grösser die Wunde gemacht wird, auch die Sterblichkeit eine grössere wird. Es darf diese Eröffnung aber nicht so klein sein, dass bei den folgenden Manipulationen die Wundränder gequetscht werden, denn letzterer Nachtheil würde bei Weitem den der kleineren Incision überwiegen. Nach Spaltung der Fascien, die man auf der Hohlfonde vornehmen kann, oder besser gleich mit den Fingern zerreisst, ist grosse Sorgfalt auf Eröffnung der Peritonealhöhle zu verwenden.

Ehe man zu der Eröffnung der Peritonealhöhle schreitet, unterbinde man jedoch die etwa blutenden Stellen sorgfältig damit kein Blut einfliesse. Man erhebt sodann das Peritoneum und macht eine kleine Incision in die man dann die Hohlfonde schiebt und in der Richtung der Wunde weiter spaltet.

Man geht sodann mit der Hand ein und untersucht den Tumor auf Adhäsionen, die kleineren löst man sofort und die derberen lässt man einstweilen stehen. Sollten etwa Darmschlingen oder Netz vorliegen, so werden solche bei Seite geschoben. Zeigen sich nun bedeutende Verwachsungen mit den Beckenknochen, der Leber, oder sehr ausgedehnte mit dem Peritoneum, so tritt an den Operateur die Frage heran, ob er die Operation aufgeben oder nur unvollständig ausführen soll. Im ersteren Falle ist dann die Wunde sofort wieder zu schliessen.

Man muss stets eine jede, wenn auch noch so kleine Blutung aus den gelösten Adhäsionen gut beseitigen, denn leicht können kleine geöffnete Gefässe den ganzen Erfolg der Operation in der Nachbehandlungsperiode in Frage stellen.

Nachdem alle Blutungen gestillt sind, wozu sich das Catgut am meisten eignet, da es entweder resorbirt wird, oder sich organisirt, schreitet man zur Verkleinerung des Tumor, indem man, wenn der Inhalt ein flüssiger, denselben mittelst eines ziemlich derben Troicarts mit Abflussrohr nach und nach abfließen lässt. Man hat hier verschiedene Arten angegeben, doch ist der von Spencer-Wells erfundene mit Vorrichtung zum Halten der Cystenwand der gebräuchlichste. Sobald nun der Tumor erschlafft, ist es leicht denselben nöthigenfalls mit Museux- oder Nélaton'scher Zange durch die nur kleine Bauchwunde zu ziehen und die noch vorhandenen Adhäsionen zu lösen. Sollte sich nun zeigen, dass der Schnitt den Tumor nicht durchlässt, so zerre man nicht, sondern erweitere die Wunde nöthigenfalls links vom Nabel, aber nach unten nicht tiefer als bis 3 Ctm. über der Symphyse. Es geschieht dabei leicht, dass einige Darmschlingen vorfallen, besonders wenn das Entfernen des Tumor plötzlich mit einem Ruck vor sich geht.

Die Adhäsionen mit der Bauchwand sind meist leicht zu trennen, nicht so die Verwachsungen mit dem Darm und Netz, es ist die Trennung derselben oft der schwierigste und langwierigste Theil der Operation. Sind die Adhäsionen lang genug, so kann man dieselben unterbinden, sonst nach

Clay's Vorgänge auch durchbrennen. Die Verwachsungen mit dem Netze sind nach der Trennung ebenfalls zu unterbinden nöthigenfalls kann auch ein Stück Netz abgetragen werden. Die unangenehmsten Adhäsionen sind jedenfalls die mit dem Darm.

Nach vollendeter Operation ist die Bauchhöhle auf das Sorgfältigste zu reinigen und sowohl durch tiefgreifende das Peritoneum mitfassende, als auch oberflächliche Nähte wieder zu schliessen.

Es ist mir leider nur möglich gewesen zwei, und zwar mit glücklichem Erfolge unternommene Operationen während ihrer ganzen Nachbehandlung genauer zu beobachten.

Ich lasse hier nun zuerst den kurzen Hergang der Operation nebst Nachbehandlung folgen, um dann meine Ansicht, besonders in Bezug auf die Nachbehandlung des Stieles darzulegen.

I. Fall.

Frau D. B. lebte in sehr guten Verhältnissen, sie ist 37 Jahre alt, war mit dem 16. Jahre zuerst und stets regelmässig menstruiert.

Seit etwa 4 Jahren verheirathet, ist sie ohne Kinder und vor ungefähr 1 $\frac{1}{2}$ Jahren hat sie zuerst eine Zunahme des Abdomen bemerkt, da nun dieselbe bis Mai 1875 nicht wieder rückgängig geworden war, so kam sie in die Klinik. Eine hier vorgenommene Punktion ergab eine grosse Menge trüber gelblicher Flüssigkeit, jedoch wurde der Umfang des Abdomen nur stellenweise kleiner. Es wurde die Diagnose auf multiloculäre Ovariencyste gestellt. Die, nach oben angeführter Methode vorgenommene Exstirpation des rechten Ovariums, ging ziemlich gut vor sich, da nur einige grössere Adhäsionen vorhanden waren.

Die Cysten entleerten, ausser einer trüben, gelben, schmutzigen Flüssigkeit auch noch hellgraue käfige Massen. Der Stiel wurde in den unteren Wundwinkel gelegt, so dass die Spencer-Wells'sche Klammer denselben in dieser Lage fixirte.

Die Ligaturen in der Bauchhöhle wurden sämmtlich mit Seide gemacht und kurz abgeschnitten.

Die Patientin hatte dabei sehr wenig Blut verloren,

aber es stellte sich bis gegen Ende des folgenden Tages in Folge der Chloroformnarkose, sehr häufiges Erbrechen ein.

Das Fieber stieg bereits am 2. Tage beträchtlich (40,8° C.) und zeigte sich links von dem Bauchschnitt, oberhalb des Poupart'schen Bandes eine starke Röthung und Schwellung.

Am 4. Tage wurde hier eine ausgiebige Incision gemacht, die vielen dünnflüssigen Eiter hervorquellen liess. Durch Sondirung konnte man feststellen, dass die Eiterung zwischen der Bauchmuskulatur noch eine Strecke weiter ging und wahrscheinlich von einem Stichkanal aus erfolgt war. Von da ab ging das Fieber langsam aber stetig zurück und ungefähr 4 Wochen später wurde die Patientin schon als vollkommen geheilt mit einem Heftpflasterverband entlassen.

2. Fall.

Dienstmagd M. Z. 22 Jahre alt, unverheirathet ist stets gesund gewesen und war vom 15. Jahre ab stets regelmässig menstruiert.

Seit vorigem Jahre bemerkte sie eine stetige Zunahme des Abdomen und suchte daher die Klinik auf.

Es wurde durch eine Punktion von der vagina aus eine grün gelbe, ziemlich klare mit nur wenigen Flocken vermischte Flüssigkeit entleert. Die Operation wurde Anfang dieses Jahres vorgenommen und zwar unter den vollkommensten Lister'schen Cautelen. Sie ging nach der gleichen oben beschriebenen Operations-Methode vor sich und verlief gut.

An Adhäsionen waren nur zwei grössere vorhanden. Der Tumor zeigte sonst allerdings viele, aber leichte Adhäsionen und bestand aus zwei nahe aneinander liegenden Cysten.

Der Inhalt war der gleiche wie der durch Punktion entleerte, nur durch Blut, wahrscheinlich durch die frühere Punktion veranlasst, etwas tingirt. Der Stiel wurde wegen seiner Derbheit in Parthieen unterbunden und mit der Klammer versehen in den unteren Wundwinkel gelegt.

Auch die in neuester Zeit so warm empfohlene Drainage wurde hier zur Anwendung gebracht. Erbrechen

trat nicht ein, aber schon am Abend ziemlich hohes Fieber ($39,7^{\circ}$ C.) und Schmerzhaftigkeit bei Berührung des Abdomen. Die Ausspülung durch das Drainagerohr ging etwas beschränkter vor sich. Am Abend des zweiten Tages zeigte es sich gänzlich durch Fibringerinzel verstopft und erforderte viele Mühe zur Reinigung. Am folgenden Morgen hatte sich die Temperatur schon bedeutend erniedrigt und nach 8 Tagen war die Bauchwunde schon vollkommen durch Granulationen geschlossen und konnte das Drainagerohr schon am 6. Tage entfernt werden. Die Temperatur blieb überhaupt nur wenig erhöht (bis $38,4^{\circ}$ C.) und nach 14 Tagen wurde Patientin schon mit Verband entlassen.

Die übrigen fünf Fälle, denen ich zwar während der Operation mit beiwohnte, die ich aber während der Nachbehandlung nicht genauer zu beobachten Gelegenheit hatte ergaben verschiedene Resultate, indem drei davon tödlich endeten (einer am Collaps und zwei an acuter Peritonitis). Auch wurde bei einem derselben der Stiel, nachdem er seiner Kürze und Dicke wegen in mehreren Parthieen unterbunden und mit ferrum candens betupft worden war, in die Bauchhöhle versenkt.

In einem anderen Falle musste sogar ein Theil des Uterus wegen Zusammenhang mit dem Tumor und vollständiger Degeneration mit entfernt werden.

Es sei mir gestattet hier über die erwähnte Drainage einiges einzufügen. Durch kleine Nachblutungen wie durch Exsudation entsteht in der Bauchhöhle leicht eine putride Beschaffenheit derselben und ist es Peaslee's Verdienst 1855 zuerst bemerkt zu haben, dass bei einer Patientin mit hohem Fieber dieser Zustand eingetreten war. Er nahm daher von der Wunde aus durch Ausspritzen eine Ausspülung der Bauchhöhle vor, indem er eine Gegenöffnung von der Scheide aus machte. Die Patientin verlor die hohe Temperatur wieder und genas.

Auf diese Angabe hin ist Marion-Sims noch weiter gegangen, indem er prophylactisch stets die Drainage angewendet wissen will, da wie er sagt die Oeffnung im Douglas'schen Raum während der Operation angelegt, derselben

keine grössere Gefährlichkeit verleiht und es nachträglich von der Scheide aus nicht möglich ist, die tiefste Stelle der excavatio-rectouterina zu treffen.

Gerade diese zu treffen ist unumgänglich nöthig, denn sonst bleibt stets ein Theil putrider Stoffe zurück. Diesen Vorschlag hat Sims in Anbetracht seiner eigenen Erfahrungen, als auch nach genauer Analyse von 39 von Spencer - Wells mitgetheilten Todesfällen gemacht. Er stellt folgende Tabelle auf:

	Spencer-WellsSims	
Intestinalobstruction	I	—
Tetanus	2	2
Pyaemie	2	3
Gerinsel im Herzen	3	—
Erschöpfung	7	—
Peritonitis	12	—
Septicämie	7	34
Nicht angegeben	5	—

und sagt daher „bei Abdominalwunden tritt der Tod durch Shoc, Haemorrhagie oder Septicämie, selten durch Peritonitis im eigentlichen Sinne ein.“ Auch Professor Dr. v. Nussbaum gibt an, dass von 78 Operirten ihm 28 an Septicämie zu Grunde gegangen seien.

Es hat diese Methode seitdem viele Verfechter gefunden. Im letzten Kriege hat man gleichfalls oft Schusswunden heilen sehen bei denen die Kugel eine Gegenöffnung hergestellt hatte.

In Betreff der Drainageröhren hat man bis jetzt jedoch noch keine Einigung erzielt, denn während meistens Kautschuckröhren angewandt werden, hat Sims jetzt eine im Mechanismus dem zweiblättrigen Speculum ähnliche sich selbst befestigende Röhre in Gebrauch, die hinreichend weit ist um einen Catheter zum Auspülen einzuführen.

Die bis jetzt mit der Drainage behandelten Fälle haben sehr gute Resultate geliefert.

Es ist leicht zu ersehen, dass die Operationsmethode durchaus noch keine feststehende ist, und dass sie noch fortwährend Veränderungen unterworfen ist. Ein gleiches ist von der Behandlung des Stiels zu sagen. Welch weiter Un-

terschied liegt schon zwischen den beiden Behandlungsweisen der extra und intraperitonealen.

A priori sollte man doch glauben es sei das Rationellste die Wunde vollkommen zu schliessen um jeden Zutritt der Luft zu verhindern und überall Verschluss zwischen gleichartigen Theilen herbeizuführen und dennoch spricht in letzter Zeit die Erfahrung für das Gegentheil und lehrt uns die extraperitoneale Methode als die bessere und zuverlässigere schätzen. Spencer Wells spricht sich sehr zu Gunsten der Klammerbehandlung aus und bringt dieselbe wenn möglich stets in Anwendung.

Wie denn überhaupt die Nachbehandlung des Stieles zu den schwierigsten Aufgaben zu zählen ist, so existirt auch darin eine große Mannigfaltigkeit.

Die extraperitoneale Behandlung, bei der eine gewisse Länge des Stieles vorausgesetzt werden muss, hat vor Allem auf ein gutes Sitzen der Klammer zu achten, damit der Stiel nicht nach geschlossener Bauchwunde, ununterbunden in die Bauchhöhle zurückgleite und Verblutung die Ursache des Misserfolges werde. Den über der Klammer sitzenden Stielrest kann man entweder unbeachtet lassen, oder der gröfseren Sicherheit wegen mit liq. ferri, Cauterisation oder Galvanocaustik behandeln. Ist der Stiel auf diese Weise glücklich in den unteren Wundwinkel eingeeilt, so entsteht jedenfalls bei allen Ausdehnungen und Bewegungen des Abdomen eine Zerrung des Stiels und zwar, noch während langer Zeit, bis endlich der Stiel sich verdünnt und von der Bauchwand abreifst, dann aber hat man eine zweite, dem Nabel ähnliche, nachgiebige Stelle, mit all den Chancen für eine Bruchpforte erlangt. Man kann nach Stilling, der bereits 1837 die extraperitoneale Behandlung des Stieles in die Praxis einführte, denselben partiell oder in toto unterbinden und ihn dann durch Nähte an die Bauchdecken fixiren. Zur Ligatur des Stieles verwendet man am zweckmäfsigsten die sogenannten Peitschenschnüre und damit auch diese nicht abgleiten, ist es gut den Stiel zu durchstechen. Miners ist sogar soweit gegangen, dafs er um nur den Stiel mit der Klammer behandeln zu können, den Tumor ausgeschält hat, doch ist

diese Methode jedenfalls gefährlich, denn bei etwa nachfolgenden Blutungen ergießen sich dieselben in den so gebildeten Sack, gehen leicht in Verjauchung über und werden dadurch Anlaß zu Infectionsheerden.

Aber die Einheilung des Stieles geht nicht stets so glatt von Statten, sondern der Stiel zeichnet oft verderblichen Einflüssen von Außen den Weg vor, auch liegt, namentlich wenn der Stiel kurz ist und stark gezerzt wird, eine große Gefahr darin, daß man in einzelnen Fällen Tetanus entstehen sah. Auch Incarceration durch Anwachsen und nachträgliches Abknicken des Darmes hat man eintreten sehen und hat sich daher stets bemüht die Versenkung des Stieles d. h. die intraperitoneale Behandlung zu verbessern. Man hat dazu verschiedene Methoden vorgeschlagen, die auch wohl alle noch in Gebrauch sind. Die Ligatur des Stieles entweder in toto oder partiell je nach der Dicke desselben ist die am meisten geübte Methode, kann jedoch durch Abgleiten der kurz abgeschnittenen Ligaturfäden zur inneren Verblutung führen.

Als Modifikation hat man die Ligaturen lang gelassen und zum unteren Wundwinkel herausgeleitet, hievon ist man jedoch bald wegen der Infectionsgefahr zurückgekommen.

Man hat daher vorgeschlagen den Stiel oberhalb der Ligatur mit *ferrum candens* zu betupfen. Auch den *Ecraseur*, sowie die galvanocautische Schneideschlinge hat man in Anwendung gezogen, aber es tritt hierbei dieselbe Gefahr innerer Verblutung auf.

Seit dem Jahre 1864 hat Baker-Brown in sehr genialer Weise eine neue Methode angegeben und damit bei 41 Operationen nur 5 Todesfälle zu beklagen gehabt, er legt vorläufig eine Klammer (*cautery-clamp*) an und durchbrennt dann langsam oberhalb mit weißglühendem *ferrum candens*. Nachdem dieses geschehen, wird die Klammer vorsichtig gelöst, spritzende Arterien nochmals mit Glüheisen behandelt und der Stiel versenkt.

Diese Methode ist jedenfalls nur bei kleineren Gefäßen anwendbar.

Auch die Torsion der einzelnen Gefäße des Stieles ist von Beclec in Chicago geübt worden, gleich wie es bei

Amputationen geschieht, aber da hier der Stiel unserm Auge entzogen wird, so ist diese Methode jedenfalls eine sehr gewagte zu nennen.

Eine zwischen beiden der extraperitonealen und intraperitonealen liegende Behandlungsweise des Stieles ist von Peaslee 1869 erdacht, er befestigt nämlich den Stiel in zwei oder mehreren Portionen an eine durchlöchernte Silberöhre und indem er darauf rechnet, daß nach ungefähr 3 bis 4 Tagen Obliteration der Gefäße eingetreten ist, löst er dann durch Schnitt von dem lumen der Röhre aus die Ligaturen und zieht beide Theile hervor.

Soll man nun zwischen diesen beiden Methoden wählen, so kann man sich wohl nur durch die erzielten Erfolge leiten lassen und diese sprechen für die extraperitoneale Behandlungsweise, denn wenn auch die Vortheile einer primären Verheilung der Bauchwunde von großem Vortheil ist, so steht damit die Gefahr einer innern Nachblutung doch keineswegs im Verhältniß und leider läßt sich die Blutung nicht stets gleich feststellen und derselben daher auch nicht gleich beikommen.

Anderenfalls bleibt nur übrig die Bauchwunde nochmals zu öffnen und den Stiel aufs Neue zu unterbinden.

Dagegen muß man bei der extraperitonealen Behandlungsweise die nachgiebigere Bauchwunde mit in den Kauf nehmen und auch die grössere Gefahr der Infection von Außen her, letztere wird jedoch bei unserer jetzigen Lister'schen Verbandmethode, wenn auch nicht ganz, so doch bis zu einem geringen Grade beseitigt.

Nach Duitot's Zusammenstellung war die Mortalität der Operirten mit extraperitonealer Behandlung des Stiels 39 Proz., die der mit Versenkung des Stiels behandelten 35 Proz. Es würde dieses Resultat gegen erstere Behandlungsweise sprechen, aber in neuerer Zeit ist dieses Verhältniß, Dank der Kenntniß von den Infectionstoffen, ein anderes geworden.

Sollte nun auch das zweite Ovarium dessen Befichtigung nie unterlassen werden darf erkrankt sein, so scheue man nicht vor diesem doppelseitigen Eingriffe zurück. Man wird sich dann allerdings meistens entschließen müssen

den einen Stiel zu versenken; findet sich an dem zweiten Ovarium nur eine mässige Vergrösserung, so kann man es sich selbst überlassen, da Fälle genug bekannt sind, in denen vergrösserte Ovarien sich zurückbildeten, oder wenigstens nicht weiter wuchsen. Finden sich aber kleine Cysten, so kann man dieselben indiciren und kauterisiren, denn bis jetzt hat die doppelseitige Ovariectomie noch fast den doppelten Prozentatz von Mortalität aufzuweisen wie die einfache.

Die Bauchwunde heilt, wenn die Wundränder gut an einander gelegt waren fast stets per primam intentionem. Seitdem die Lister'sche Verbandmethode so sehr günstige Resultate ergeben hat wird man auch wohl dieselbe anwenden und zugleich eine leichte Compression damit verbinden.

Der Reihe nach besteht derselbe aus Protective, Krüllgaze, einigen Schichten trockner Gaze und einem Stück Gummizeuge. Ob es in der Folge nöthig sein wird das Protective anzuwenden ist sehr fraglich, denn wenn es nur zum Schutz der Wunde dienen soll, so läst sich derselbe auch durch Gummizeug erreichen, ist es aber nur in Anwendung um ein Reagens auf zeretzten Eiter zu bilden, so läst sich daselbe erreichen, wenn man etwa blanke Silbernadeln durch die Drainageröhren sticht und diese dadurch zugleich fixirt.

Auch der schon seit einiger Zeit in Gebrauch gekommene Yuteverband kann hier Anwendung finden und läst sich auch schon wegen der grösseren Quantität der Yute eine gute Compression damit ausüben.

Die Patientin wird man nach der Operation gut erwärmen und ihr Excitantien reichen. Sollte sich Erbrechen einstellen, so wird dies sehr wirksam mit Eispillen bekämpft.

Während der ersten Tage reiche man der Patientin eine flüssige nahrhafte Kost und um die Peristaltik des Darms und die Wirksamkeit der Bauchpresse zu verhindern, Opium.

Bei grossen Schmerzen und unruhigen Schlaf macht man eine subcutane Morphiuminjection.

Der Urin muss in den ersten Tagen mehrmals täglich mit dem Catheter entleert werden. Hat man die Drainage eingeleitet, so ist für eine ausgiebige Spülung mit schwach desinficirenden Lösungen Sorge zu tragen. Peritonitis wird hiebei, da sie meist eine septische ist wohl wenig vorkommen, sonst muss dieselbe mit Eis bekämpft werden. Nach 10 bis 12 Tagen wird man in der Regel auch das Drainagerohr entfernen können, die Nähte kann man erst nach und nach, vom fünften Tage an entfernen, das Abfallen der Klammer überlässt man sich selbst und erfolgt gewöhnlich am 10. Tage. Bei Schmerzen der Bauchdecken wird in Deutschland die Kälte in Anwendung gezogen, in England dagegen die Wärme, da jedoch mit beiden Mitteln Erfolg erzielt worden ist, so wird man es den Patientinnen überlassen können, das eine oder andere anzuwenden. Ist die Wunde ganz geschlossen und kein Fieber mehr vorhanden, so wird die Patientin das Bett verlassen können aber nur mit einem Heftpflasterverband versehen und selbst wenn dieser nach einigen Wochen entfernt wird, ist es rathsam noch während längerer Zeit eine Leibbinde tragen zu lassen.

Ziehen wir zum Schlusse in Betracht um wie viel sich in den letzten Jahren durch die Erfahrung und Gewandtheit der Operateure die Erfolge der Ovariectomie gemehrt haben und vergleichen damit die Statistik anderer grösserer Operationen, die zum Theil doch eine viel höhere Mortalität ergibt, so ist man zu der Hoffnung berechtigt, dass die Ovariectomie bald als eine der weniger gefährlichen Operationen dastehen und ihr dann auch zum Wohle der Menschheit ein grösserer Wirkungskreis zuerkannt werden wird.
